



Székhely: Sopron, Magyar utca 14. | Postacím: H-9401 Sopron, Pf.: 217. | Telefonszám: +36 99/788-435

## A CD4+ se

Forr

ás:

## A CD4+ sejtszám javulása alkohol-elvonás után HIV-pozitív alkoholista betegekben

**Cikk:** Pol, S és mtsai. - AIDS 10, 1293, 1996

A HIV-összetevők hatásak egy ideális hidegszáll alkohollal, különösen sokkal gyorsabb, akik kapták az intravénás kábítószeresektől, és a behatott alkohollal is bírhat át. In vitro az alkohol nával a HIV-működést csökkentő hatású.

[illegible]

Hasonló eredménnyel végződött egy, HCV fertőzött alkoholistákban végzett vizsgálat, amely szerint a *relapsus*ok in vivo-ko hasonlóan az alkoholistákban a HCV vírusaemia mértéke lényegesen magasabb volt, amely az alkohol-elvonás után csökkent. Szerzők is tisztában vannak azzal, hogy a HCV-vírusaemia mérőszám kiterjedt vizsgálatra szűkegy lenne a HCV-fertőzöttekben

Eddigi eredmények alapján is indokoltak tartják azonban a szakértők azt, hogy minden HIV-fertőzöttől fel kell mérni az alkohol fogyasztás mértékét, és az alkoholistáknak felülbírni az elfogyasztott alkohol mennyiség csökkentését kell tanácsot